

Agrimónia eupatória L.
(Репешок обыкновенный)

Rosáceae



Желтые цветки собраны в длинные
колосовидные кисти

Стебель ветвистый,
прямостоячий

Листья непарноперистые, стеблевые,
черешковые, очередные

Плоды многочисленные, созревают
неодновременно, начиная с нижней
части соцветия



Листья непарноперистые с более крупными эллиптическими листочками и мелкими промежуточными долями

Листочки с 6–10 зубцами с каждой стороны
(в верхней половине листа)

Листья сверху темно-зеленые, снизу бело-бархатистые

Листья с прилистниками





Стебель опушен длинными
оттопыренными и короткими
курчавыми волосками

Листья опушены мелкими
волосками, по жилкам длинными
простыми волосками



Лепестки свободные,
желтые



Пестика 2
Тычинок больше 10
(11, 13)





Гипантий
обратноконический

Завязь верхняя



Чашелистиков 5, они
чередуются с лепестками

Гипантий снаружи
волосистый и имеет
крючковидные щетишки



Плод с 2 односеменными
плодиками, заключенными в
гипантий

Основание гипантия
клиновидное

Плод имеет на гипантии
глубокие борозды

Плод имеет оттопыренные
крючковатые щетинки (4 ряда)

